



盐酸雷尼替丁胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：盐酸雷尼替丁胶囊

英文名称：Ranitidine Hydrochloride Capsules

汉语拼音：Yansuan Leinitiding Jiaonang

【成份】本品每粒含主要成份雷尼替丁 0.15 克。辅料为淀粉。

【性状】本品为胶囊剂，内容物为类白色或淡黄色颗粒。

【作用类别】本品为抗酸类非处方药药品。

【适应症】用于缓解胃酸过多所致的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。

【规格】0.15 克（以雷尼替丁计）。

【用法用量】口服。成人一次 1 粒，一日 2 次。于清晨和睡前服用。

【不良反应】

1. 常见的有：恶心、皮疹、便秘、乏力、头痛、头晕等。
2. 对肾功能、性腺功能和中枢神经的不良反应较轻。
3. 少数患者服药后引起轻度肝功能损伤，停药后症状即消失，肝功能也恢复正常。

【禁忌】

1.8 岁以下儿童禁用。

2. 孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品连续使用不得超过 7 天，症状未缓解，请咨询医师或药师。
2. 老年患者与肝肾功能不全患者慎用。
3. 如服用过量或出现严重不良反应，请立即就医。
4. 8 岁以上儿童用量请咨询医师或药师。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。

7.请将本品放在儿童不能接触的地方。

8.儿童必须在成人监护下使用。

9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1.与普鲁卡因胺并用，可使普鲁卡因胺的清除率降低。

2.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 本品为 H₂ 受体抑制剂，具有抑制胃酸分泌作用。口服后经胃肠道吸收迅速。

【贮藏】 遮光，密封，在干燥处保存。

【包装】 铝塑包装，12 粒/板。

【有效期】 24 个月。

【执行标准】《中华人民共和国药典》2005 年版二部

【批准文号】 国药准字 H11021100

【说明书修订日期】

【生产企业】

企业名称：北京京铁华龙药业有限责任公司

生产地址：北京市密云县工业开发区水源路 232 号

邮政编码：101500

电话号码：010-69076182

传真号码：010-69076182

如有问题可与生产企业联系